



Dr F.-O. GAY
FMH Anesthésiologie
Président

Dr M.-A. SCHLÄPFER
FMH Anesthésiologie
Vice-Président

Dr A. HEHL MARET
FMH Anesthésiologie

Dr M. de RIEDMATTEN
FMH Anesthésiologie
FMH Soins intensifs
FMH Médecine Interne

Dr G. ZEN RUFFINEN
FMH Anesthésiologie
FMH Médecine Générale

Dr L. CALVI
FMH Anesthésiologie

Information pour une sédation pour Gastroskopie / Coloscopie

Afin que votre gastroscopie / coloscopie se déroule de manière optimale, il est possible de faire une légère anesthésie (sédation), à condition que vous soyez à jeûn depuis 6 heures au minimum.

A votre arrivée, le médecin anesthésiste vous informera personnellement du déroulement de cette sédation, qui consiste en une injection intraveineuse d'un anesthésiant durant la durée de l'examen.

Pendant l'intervention, vous êtes sous surveillance continue (activité cardiaque, fonction respiratoire,) par le personnel d'anesthésie. La méthode est fiable et les risques sont extrêmement faibles. Il est très important que vous suiviez les règles du jeun (6h sans boire, ni manger, ni fumer) afin de diminuer le risque de broncho-aspirations.

Après l'examen sous anesthésie, une tierce personne doit venir vous chercher afin de vous reconduire à domicile.

Pour d'éventuelles questions nous restons à votre disposition le jour de votre intervention.

Veillez nous retourner ce document dûment signé le jour de votre intervention.

Service d'anesthésie

Je soussigné(e), donne mon accord pour une sédation lors de mon examen :

Nom/Prénom :

Date :